

**ለ SPIKEVAX (የሚነበበው SPIK-vax ተብሎ ነው)
(COVID-19 ክትባት፣ mRNA) (2023-2024 Formula)
(2024-2025 ፎርሙላ)**

SPIKEVAX ከመከተብዎ በፊት እባክዎ ይህንን የመረጃ ወረቀት ያንብቡ። ይህ ሰነድ ከጤና እንክብካቤ አቅራቢዎ ጋር የመነጋገርን ቦታ እንዲተካ ተብሎ የታሰበ አይደለም። ምንም አይነት ጥያቄ ካለዎት ወይም ተጨማሪ መረጃ ከፈለጉ፣ እባክዎ ከጤና እንክብካቤ አቅራቢዎ ጋር ይነጋገሩ።

SPIKEVAX ምንድን ነው?

SPIKEVAX እርስዎን ከCOVID-19 የሚከላከል ክትባት ነው። SPIKEVAX አገልግሎት ላይ የሚውለው እድሜያቸው 12 ዓመት እና ከዚያ በላይ ለሆኑ ሰዎች ነው። የ SPIKEVAX ክትባት ሁሉንም የተከተቡ ሰው ላይከላከል ይችላል።

SPIKEVAX COVID-19ን የሚያመጣውን SARS-CoV-2ን አይዘም። SPIKEVAX COVID-19 ሊያሰጥዎት አይችልም።

SPIKEVAX መከተብ/መውሰድ የሌለበት ማን ነው?

በሚከተሉት ሁኔታዎች SPIKEVAX መውሰድ የለብዎትም፡

- የበፊቱን የSPIKEVAX ወይም ሞደርና (Moderna) የCOVID-19 ክትባትን ዶዝ ከወሰደ በኋላ ከባድ አለርጂ ካጋጠመው።
- በዚህ ክትባት በየትኛውም ግብአት ምክንያት ከባድ አለርጂ አጋጥሞ ከነበረ(የSPIKEVAX ግብዓቶች ምንድን ናቸው? የሚለውን ይመልከቱ)

ለጤና እንክብካቤ አቅራቢዬ ምን መናገር አለብኝ?

ለጤና እንክብካቤ አቅራቢዎ የሚከተሉትን ጨምሮ ስለ ሁሉም የጤና ሁኔታዎችዎ ይነገሩት፡

- የትኛውም አለርጂዎች ካሉብዎ
- ቀደም ሲል ማንኛውንም የCOVID-19 ክትባትን ዶዝ ከወሰዱ በኋላ ከባድ አለርጂ ካጋጠመዎ
- ማዮካርዲቲስ (የልብ ጡንቻ መቆጣት) ወይም ፔሪካርዲቲስ (የልብ ውጫዊ አገናኝ መስመሮች መቆጣት) ያለብዎ ስለመሆኑ
- ትኩሳት ካለብዎ
- የደም መፍሰስ ችግር ወይም የደም መቅጠን ካለብዎ
- የበሽታ መከላከል አቅምዎ የተዳከመ ከሆነ ወይም የበሽታ መከላከል ስርአትዎ ላይ ተጽእኖ የሚፈጥር መድሀኒት እየወሰዱ ከሆኑ
- ነፍሰ ጡር ከሆኑ ወይም የማርገዝ እቅድ ካሉዎ
- የሚያጠቡ ከሆነ
- ሌላ ማንኛውንም የCOVID-19 ክትባት ከወሰዱ
- ከክትባት ጋር በተያያዘ እራስዎን ስተው የነበረ ከሆነ

SPIKEVAX የሚሰጠው እንዴት ነው?

SPIKEVAX በመርፌ መልኩ በጡንቻ ላይ ይሰጣል።

የSPIKEVAX ስጋቶች ምንድን ናቸው?

ከባድ የአለርጂ አጻፋዊ ምላሽ የ SPIKEVAX እና ሞደርና (Moderna) የCOVID-19 ክትባት በተከተሉ የተወሰኑ ሰዎች ላይ ተከስተዋል። SPIKEVAX ከባድ የአለርጂ አጻፋዊ ምላሽ ሊያስከትል የሚችልበት በጣም አነስተኛ ዕድል አለ። ከባድ አለርጂ በዋናነት የሚያጋጥመው የ SPIKEVAX ዶዝ ከተወሰደ በኋላ ካሉት ጥቂት ደቂቃዎች ጀምሮ እስከ 1 ሰዓት ያክል ነው። በዚህም ምክንያት፣ የጤና እንክብካቤ አቅራቢዎች የክትባቱን ሁኔታ ለመቆጣጠር እንዲያስችላው ክትባቱን በወሰዱበት ቦታ እንዲቆዩ ሊጠይቅዎ ይችላል። የከባድ አለርጂ ምልክቶች የሚከተሉትን ሊያጠቃልሉ ይችላሉ፡

- ለመተንፈስ መቸገር
- የፊት ወይም ጉሮሮ እብጠት
- የልብ ምት መፍጠን
- በመላ ሰውነትዎ ላይ የሚፈጠር ሽፍታ
- መደበትና ድካም

ማዮካርዲቲስ (የልብ ጡንቻ መቆጣት) ወይም ፔሪካርዲቲስ (የልብ ውጫዊ አገናኝ መስመሮች መቆጣት) በጥቂት የ SPIKEVAX እና ሞደርና (Moderna) የCOVID-19 ክትባት ጨምሮ የ mRNA COVID-19 ክትባቶች በወሰዱ ሰዎች ላይ ተከስቷል። SPIKEVAX እና የሞደርና (Moderna) የCOVID-19 ክትባትን ተከትሎ ማዮካርዲቲስ እና ፔሪካርዲቲስ በብዛት የተከሰቱት እድሜያቸው ከ18 እስከ 24 ዓመት በሆኑ ወንዶች ላይ ነው። በእነዚህ አብዛኞቹ ግለሰቦች ላይ ምልክቶቹ መታየት የጀመሩት ክትባቱን በወሰዱ በጥቂት ናት ውስጥ ነው። ይህ የሚያጋጥምበት እድል በጣም ዝቅተኛ ነው። እርስዎ ወይም ልጅዎ ክትባቱን ከወሰዱት በኋላ፣ በተለይም የክትባቱን ዶዝ ከወሰዱት በኋላ ባሉት 2 ሳምንታት ውስጥ የትኛውም የሚከተሉት ምልክቶች ከታዩባችሁ ወዲያውኑ የህክምና ክትትል ያድርጉ፡

- የደረት ህመም
- ትንፋሽ ማጠር
- የፈጣን አተነፋፈስ፣ የልብ መርገብገብ ወይም መውጋት ስሜት

በSPIKEVAX እና በሞደርና (Moderna) የCOVID-19 ክትባት የህክምና ሙከራዎች ሪፖርት የተደረጉ የጎረቤት ውጤቶች የሚከተሉትን ያጠቃልላሉ፡

- ክትባቱ የሚሰጥበት የሰውነት ክፍል አካባቢ የሚፈጠሩ አሉታዊ ምላሾች፡ ህመም፣ ክትባቱ የሚሰጥበት እጅ የብሽሽት ክፍል መቆጣትና እብጠት፣ እብጠት (የሰውነት መደደር) እና መቅለት
- ጠቅላላ አሉታዊ ምላሾች፡ ድካም፣ ራስ ምታት፣ የጡንቻ ህመም፣ የመገጣጠሚያ ህመም፣ ብርድ ብርድ ማለት፣ ማቅለሽለሽና ማስመለስ፣ ትኩሳት፣ እና ሽፍታ

ሪፖርት የተደረጉ ሌሎች የጎረቤት ጉዳዮች የሚከተሉትን ያጠቃልላሉ፡

- ከባድ አለርጂ
- ደረቱካሪያ (የሚያሳክ ሽፍታ)
- ማዮካርዲቲስ (የልብ ጡንቻ መቆጣት)
- ፔሪካርዲቲስ (የልብ ውጫዊ አገናኝ መስመሮች መቆጣት)
- ከክትባቱ ጋር በተያያዘ እራስዎን ስተው ያውቁ ከሆነ

SPIKEVAX ክትባት የሚያስከትላቸው የጎረቤት ውጤቶች እነዚህ ብቻ ላይሆኑ ይችላሉ። እርስዎን የተመለከቱ የጎረቤት ጉዳዮችን አስመልክቶ የጤና እንክብካቤ አቅራቢዎን ይጠይቁ። የጎረቤት ጉዳዮችን ለክትባት አሉታዊ ክስተት ሪፖርት ማድረጊያ ስርዓት (VAERS) በስልክ ቁጥር 1-800-822-7967 ወይም

<https://vaers.hhs.gov> ሪፖርት ያድርጉ።

ነፍሰ ጡር ወይም የማጠባ ቢሆንስ ምን ይሆናል?

ነፍሰ ጡር ከሆኑ ወይም የሚያጠቡ ከሆነ ስለ አማራጮችዎ ከጤና እንክብካቤ አቅራቢዎ ጋር ይወያዩ።

የSPIKEVAX ግብአቶች ምንድን ናቸው?

SPIKEVAX የመሚከተሉትን ግብአቶች ይይዛል፡

- ሜሴንጆር ሪቦኒውሴሊክ አሲድ (mRNA)፣
- ሊፒዶች (SM-102፣ ፖሊቲሊን ግሊኮል [PEG] 2000 ዲሚሪስቶይል ግሊሴሮል [DMG]፣ ኮሌስትሮል እና 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-ፎስፎካሊን [DSPC])፣
- ትሮሜታሚን
- ትሮሜታሚን ሀይድሮክሎራይድ
- አሴቲክ አሲድ
- ሶዲየም አሴቴት ትራይሀይድሬት
- እና ስኳር

SPIKEVAX ምንም አይነት ሳይባላሽ ማቆያ ነገር አይጠቀምም።

ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት፣ ከጤና እንክብካቤ አቅራቢዎ ጋር ይነጋገሩ፣ www.spikevax.com የሚለውን ድረ ገጽ ይጎብኙ፣ ወይም በስልክ ቁጥር 1-866-MODERNA (1-866-663-3762) ይደውሉ።

የተመረተው ለ፡

Moderna US, Inc. Princeton, NJ 08540

©2024 ModernaTX, Inc. ሙብቱ በህግ የተጠበቀ ነው። SPIKEVAX የModernaTX, Inc. የተመዘገበ የንግድ ምልክት ነው። የፈጠራ ባለቤትነት(ቶች)፣ www.modernatx.com/patents የተሻሻለበት ቀን፣ ነሃሴ 2024