

معلومات للمتلقين ومقدمي الرعاية SPIKEVAX
(pronounced SPĪK-văx)
(لقاح كوفيد-19، الرنا المرسال)
(صيغة 2025-2024)

يرجى قراءة ورقة المعلومات هذه قبل الحصول على SPIKEVAX. ليس المقصود من هذا الملخص أن يحل محل التحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك. إذا كانت لديك أسئلة أو كنت ترغب في الحصول على مزيد من المعلومات، فيرجى التحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.

ما هو SPIKEVAX؟

هو لقاح لحمايتك من فيروس كورونا SPIKEVAX (COVID-19) مخصص للأشخاص بعمر 12 عامًا فما فوق. قد لا يحمي التطعيم باستخدام SPIKEVAX جميع الأشخاص الذين يتلقون اللقاح.

لا يحتوي SPIKEVAX على SARS-CoV-2، الفيروس الذي يسبب مرض كوفيد-19. لا يمكن لـ SPIKEVAX أن يعطيك كوفيد-19.

من هم الأشخاص الذين يحظر عليهم تلقي لقاح SPIKEVAX؟

يجب ألا تحصل على SPIKEVAX إذا كان لديك:

- تفاعل تحسسي شديد بعد تلقي جرعة سابقة من لقاح SPIKEVAX أو أي لقاح من لقاحات موديرنا المضادة لكوفيد-19
- رد فعل تحسسي شديد تجاه أي مكون من مكونات هذا اللقاح (انظر ما هي المكونات الموجودة في SPIKEVAX؟)

ماذا يجب أن أخبر مقدم الرعاية الصحية الخاص بي؟

أخبر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك عن جميع حالاتك الصحية، بما في ذلك إذا كنت:

- تعاني من الحساسية
- كان لديك رد فعل تحسسي شديد بعد تلقي جرعة سابقة من أي لقاح لكوفيد-19
- أو المعاناة من التهاب عضلة القلب (التهاب العضلة القلبية) والتهاب التامور (التهاب غلاف القلب)
- أو الإصابة بالحمى
- تعاني من خلل في نزيف الدم أو إذا كنت تعاني من تجلط الدم
- تعاني من نقص المناعة أو تتناول دواء يؤثر على جهازك المناعي
- حاملاً أو تخططين للحمل
- أو الرضاعة
- تلقيت لقاحًا آخر لـ كوفيد-19،
- سبق أن تعرضت للإغماء بسبب حقنة

كيف يتم إعطاء SPIKEVAX؟

يتم إعطاء SPIKEVAX كحقنة في العضلات.

ما هي مخاطر SPIKEVAX؟

حدثت تفاعلات حساسية شديدة لدى بعض الأشخاص الذين تلقوا لقاح SPIKEVAX ولقاحات موديرنا لكوفيد-19. هناك احتمال ضئيل جدًا أن يتسبب SPIKEVAX في حدوث رد فعل تحسسي شديد. عادةً ما يحدث رد فعل تحسسي شديد خلال بضع دقائق إلى ساعة واحدة بعد تناول جرعة SPIKEVAX. لهذا السبب، قد يطلب منك مقدم الرعاية الصحية الخاص بك البقاء لفترة قصيرة في المكان الذي تلقيت فيه اللقاح. يمكن أن تشمل علامات رد الفعل التحسسي الشديد ما يلي:

- صعوبة في التنفس
- تورم في وجهك وحلقك
- تسارع ضربات القلب
- طفح جلدي في كامل الجسم
- دوخة وشعور بالضعف

حدث التهاب عضلة القلب (التهاب عضلة القلب) والتهاب التامور (التهاب البطانة خارج القلب) لدى بعض الأشخاص الذين تلقوا لقاحات mRNA لكوفيد-19، بما في ذلك لقاحات SPIKEVAX وموديرنا لكوفيد-19. حدث التهاب عضلة القلب والتهاب التامور بعد لقاحات SPIKEVAX وموديرنا لكوفيد-19، وكان ذلك أكثر شيوعًا عند الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا و 24 عامًا. في معظم هؤلاء الأفراد، بدأت الأعراض في غضون أيام قليلة بعد التطعيم. وفرصة حدوث ذلك منخفضة للغاية. يجب عليك طلب العناية الطبية على الفور إذا كنت تعاني أنت أو طفلك من أي من الأعراض التالية بعد تلقي اللقاح، خاصة خلال الأسبوعين التاليين لتلقي جرعة من اللقاح:

- ألم في الصدر
- ضيق في التنفس
- الشعور بخفقان القلب السريع أو الارتجاف أو دقات القلب الشديدة

تشمل الآثار الجانبية التي أُبلغ عنها في التجارب السريرية فيما يتعلق بلقاحات SPIKEVAX وموديرنا المضادة لكوفيد-19 ما يلي:

- ردود الفعل في موضع الحقن: الألم، والمضض، وتورم العقد اللمفية في نفس الذراع الذي تم الحقن فيه، والتورم (التيئيس)، والاحمرار.
- الآثار الجانبية العامة: الإرهاق، والصداع، والألم في العضلات، والألم في المفاصل، والقشعريرة، والغثيان، والقيء، والحُمى.

تشمل الاعراض الجانبية الأخرى:

- ردود فعل تحسسية شديدة
- الحكّة (طفح جلدي أو الشرى)
- التهاب عضلة القلب (التهاب العضلة القلبية)
- التهاب التامور (التهاب غلاف القلب)
- الإغماء المصاحب لحقن اللقاح

قد لا تكون هذه جميع الآثار الجانبية المحتملة لـ SPIKEVAX. اسأل مقدم الرعاية الصحية الخاص بك عن أي آثار جانبية تهمك. يمكنك الإبلاغ عن الآثار الجانبية إلى نظام الإبلاغ عن الأحداث الضائرة للقاحات (VAERS) على الرقم 1-800-822-79671 أو

<https://vaers.hhs.gov>

ماذا لو كنت حاملاً أو مرضعة؟

إذا كنت حاملاً أو مرضعة، ناقشي خياراتك مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.

ما هي مكونات SPIKEVAX؟

يحتوي SPIKEVAX على المكونات التالية:

- الحمض الريبي النووي المرسال (mRNA)
- lipids (SM-102, polyethylene glycol [PEG] 2000 dimyristoyl glycerol [DMG], (cholesterol, and 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine [DSPC])
- تروميتامين
- تروميتامين هيدروكلوريد
- حمض الاسيتيك
- خلاص الصوديوم ثلاثي الهيدرات
- سكروز

SPIKEVAX لا يحتوي على مواد حافظة.

إذا كنت ترغب في الحصول على مزيد من المعلومات، فتحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك أو قم بزيارة أو اتصل بالرقم (1-866-663-3762) (1-866-MODERNA).

صنع لصالح:

Moderna US, Inc.
Princeton, NJ 08540

© ModernaTX, Inc 2024. جميع الحقوق محفوظة.

SPIKEVAX علامة تجارية مسجلة لشركة

ModernaTX, Inc

Patent(s): www.modernatx.com/patents

تاريخ التنقيح: أغسطس 2024