

接种者与护理者须知SPIKEVAX
(读音 SPĪK-văx) (COM D-19 mRNA疫苗)
(2024-2025年配方)

接种SPIKEVAX前，请阅读本情况说明书。本摘要无法取代与医疗护理机构之间的交流。如有任何疑问或者需要更多信息，请咨询您的医疗护理机构。

什么是SPIKEVAX?

SPIKEVAX是一种预防COVID-19的疫苗，适合12岁及以上人群接种。SPIKEVAX并非对所有接种者都具有保护作用。

SPIKEVAX不含导致COVID-19的SARS-CoV-2病毒。SPIKEVAX不会导致您感染COVID-19。

哪些人不宜接种SPIKEVAX?

如果您有以下情况，请勿接种SPIKEVAX：

- 接种前一剂SPIKEVAX或莫德纳COVID-19疫苗后出现严重过敏反应。
- 对本疫苗中的任何成分有过严重过敏（参见SPIKEVAX含有哪些成分？）

我应该向医疗护理机构告知哪些信息?

请告知医疗护理机构您的所有医疗病症，包括是否存在以下情况：

- 任何过敏
- 既往接种任何COVID-19疫苗后出现过严重的过敏反应
- 曾患有心肌炎（心肌发炎）或心包炎（心脏外层包膜发炎）
- 发热
- 出血性疾病或正在服用抗凝药
- 免疫力低下或正在服用影响免疫系统的药物
- 怀孕或正计划怀孕
- 正在母乳喂养
- 已接种任何其他COVID-19疫苗
- 曾因注射而晕厥

SPIKEVAX采用哪种接种方式?

SPIKEVAX采用肌肉注射方式。

接种SPIKEVAX有哪些风险？

部分接种SPIKEVAX和莫德纳COVID-19疫苗的人发生了严重过敏反应。SPIKEVAX有极小的可能性会引起严重过敏反应。严重过敏反应通常会发生在接种SPIKEVAX后的几分钟到一小时内。因此，您的医疗护理机构可能会要求您在疫苗接种地点短暂停留观察。严重过敏反应的症狀可能包括：

- 呼吸困难
- 脸部及喉咙肿胀
- 心跳加速
- 全身皮疹
- 头晕和虚弱

一些人接种COVID-19 mRNA疫苗（包括SPIKEVAX和莫德纳COVID-19疫苗）后出现了心肌炎（心肌炎症）和心包炎（心脏外膜炎症）。接种SPIKEVAX和莫德纳COVID-19疫苗后出现心肌炎和心包炎的情况最常见于18至24岁的男性。在大多数个体中，症状在疫苗接种后几天内开始出现。出现此类症状的可能性非常低。如果您或您的孩子在接种疫苗后出现以下任何症状，请立即就医，尤其是在接种一剂疫苗后的2周内：

- 胸痛
- 气短
- 心跳加快、心慌或感觉心脏砰砰跳

在SPIKEVAX和莫德纳COVID-19疫苗的临床试验中，已报告的副作用包括：

- 注射部位反应：注射手臂出现疼痛、压痛、淋巴结肿大、肿胀（发硬）、发红
- 一般副作用：疲劳、头痛、肌肉痛、关节痛、寒战、恶心呕吐、发烧及皮疹

已报告的其他副作用包括：

- 严重过敏反应
- 荨麻疹（瘙痒的皮疹/麻疹）
- 心肌炎（心肌炎症）
- 心包炎（心脏外层包膜炎症）
- 与注射疫苗有关的晕厥

这些可能不是SPIKEVAX疫苗的所有可能副作用。向您的医疗保健机构询问您担心的任何副作用。您可以向“疫苗不良事件报告系统（VAERS）”报告疫苗副作用，拨打电话1-800-822-7967或者访问<https://vaers.hhs.gov>。

如果我是孕妇或正在哺乳期会怎么办？

如果怀孕或处于哺乳期，请与您的医疗保健机构讨论您的选择。

SPIKEVAX中含有哪些成分？

SPIKEVAX含有以下成分：

- 信使核糖核酸（mRNA）
- 脂质（SM-102、聚乙二醇[PEG]2000双肉豆蔻酰甘油 [DMG]、胆固醇和1,2-二硬脂酰-sn-甘油-3-磷酸胆碱 [DSPC]）
- 氨丁三醇
- 盐酸氨丁三醇
- 乙酸
- 三水乙酸钠
- 蔗糖

SPIKEVAX不含防腐剂。

如需了解更多信息，请咨询您的医疗护理机构或访问www.spikevax.com，或者拨打电话1-866-MODERNA（1-866-663-3762）。

制造委托方：

Moderna US, Inc. Princeton, NJ 08540

©2024 ModernaTX, Inc. 版权所有。

SPIKEVAX是ModernaTX, Inc. 公司的商标。

专利：www.modernatx.com/patents

修订日期：2024年8月